

羊角蜜的种植方法

种植技术：

1、首先来说，羊角蜜甜瓜甜不甜和品种有着非常大的关系，所以对于种子的选择要特别注意，一定要选择优质的羊角蜜甜瓜的种子，千万不要为了贪便宜选择一些没有保障的“三无产品”。

2、种植时间

羊角蜜甜瓜栽培有两种模式，一种是露地栽培，一种是大棚栽培。露地栽培一般在四月中下旬，温度在 15℃左右种植，8 月份成熟上市。而现在大多数都是大棚栽培，2 月中下旬播种，3 月中下旬定植，5 月下旬上市。

3、育苗

羊角蜜甜瓜一般采用南瓜做砧木进行嫁接育苗。嫁接时要注意砧木南瓜要提前羊角蜜甜瓜 12~15 天左右播种。而甜瓜一般在 5 天之后，2 片子叶多完全伸展开之后就可进行嫁接。播种前要进行温汤浸种（在 55℃的水中浸泡 10~15 分钟，搅拌至 30℃左右，搓洗种子表面附着的粘液，浸 4~6 小时左右，然后放在 28~32℃的环境下催芽，等到 70%左右的种子发芽之后就可以进行播种了）。

4、苗期管理

在为出苗之前，苗床的温度一般控制在 28~30℃左右，等到苗出土之后，为了防止胚轴徒长，日温就维持在 22~25℃之间，夜温维持在 15℃之上。

嫁接的方法一般采用的是贴接法嫁接，所以嫁接的时候要注意切口角度的大小，以免对生长不利。嫁接后三天内要密封在小拱棚内，注意遮阴，是拱棚内的湿度保持在 90~100%之间，以免接穗失水萎蔫影响接口愈合。在这三天之内，温度一般控制在日温 28~30℃，夜温在 20~22℃。等拱棚揭开之后，温度可降低至日温 25~28℃，夜温在 18~20℃，等伤口完全愈合，即可进行日常的管理，知道生长至 3 叶一心时定植。

在嫁接之前的头一天，可以使用 75%百菌清可湿性粉剂 800 倍液把砧木和接穗全部都喷施一遍，能减少病菌对接口造成损伤。

5、定植

羊角蜜甜瓜不耐劳，所以最好选择种植在排水良好、通气性好的肥沃砂土上。定植时要选择晴天上午定植。由于羊角蜜甜瓜对养分的需求比较高，所以在定植之前一定要施足底肥。一般中等肥力的土壤一亩地施有机肥 3000~4000kg、尿素 20kg、过磷酸钙 5kg、硫酸钾 30kg。施肥之后深翻起垄栽培。

6、定植后管理

定植后缓苗，将棚室内日温保持在 30℃左右，夜温保持在 20℃左右，持续 3~5 天即可完成缓苗。缓苗后温度一般保持在 25~28℃，夜温则保持在 12~15℃即可。

当植株长至 30cm 左右就进行吊蔓，吊蔓时要选择比较结实的绳子，因为羊角蜜甜瓜的结果量比较大，以免绳子不结实坠断。整枝方式多以单蔓整枝为主，22 片叶时摘心，16~19 片叶选留坐果蔓，坐果后留一片叶摘心，在第一茬瓜纵径长到 8~10cm 左右时及时疏瓜，一般每株留 3 个瓜，其余幼瓜疏掉，16 片叶以下子蔓全部去掉。在第一茬瓜采收之后，按照同样方法留第二茬瓜。

肥水管理：定植后可根据土壤墒情浇一次缓苗水，之后的情况是不干不浇水。当瓜胎长到 12cm 的时候，可在晴天上午适当浇小水。在结果期的时候要注意养分、水分的管理，此时植物生长旺盛，为了满足甜瓜开花结果的需求，一般每隔 10~12 天浇一次水，没浇水 2 次，冲一次肥。

病虫害防治：羊角蜜甜瓜的抗性不强，所以非常容易发生病虫害，比如白粉病、褐斑病，所以要及时做好病害防治。首先要做好棚室内的清理，将患病的植株、病叶及时清理出棚室，避免病害的传播，悬挂黄板或者防虫网之类物理设施减少虫害的发生。其次培养壮苗，增强植株的抗病性。最后使用适量的药剂进行防治，比如喷施 70%吡虫啉可湿性粉剂防治白粉虱、蚜虫之类的等等。

羊角蜜甜瓜

羊角蜜甜瓜，是一种水果。果实长锥形，一端大，一端稍细而尖，细长如羊角，故名羊角蜜。早中熟品种，植株长势强，子蔓结瓜，雌花密。

