

露天豆角种植技术

豆角的种植方法如下：

一、整地、施肥

豆角喜土层深厚的土壤，选择富含有机质、上年未种过豆角的土地，播前应深翻 25cm，每亩施有机肥料 5000kg、蔬菜专用复合肥 50kg 作基肥，然后平整成 1.2m 宽的小畦。

二、播种、育苗

豆角播种期露地栽培育苗为 3 月下旬，露地栽培直播为 4 月上中旬。每亩播种量为 2.5kg 左右。育苗一般选用大棚，每穴播种 2—3 粒，浇透水，注意保温和控制徒长。育苗时将精选的种子，用 80℃—90℃ 的热水将种子迅速烫一下，迅即加入冷水降温，保持水温 25℃—30℃ 左右 4 小时，捞出稍晾后播种。出苗后，白天保持温度 20~25℃，以保证幼苗生长整齐、健壮。种子发芽期和幼苗期床土不宜过湿，以免降低发芽率，或导致幼苗徒长，甚至烂根死苗。

三、定植

当营养钵育苗的小苗 2~3 片复叶时定植。露地栽培可在 4 月下旬定植。用打洞器打洞移栽，定植后浇好定根水，并填实细土和封严定植孔。一般每畦移栽两行豆角，穴距 20cm，每亩 5000—5500 斤。

四、田间管理

豆角从移栽到开花前，以控水、中耕促根为主，进行适当蹲苗，促进开花结荚；座荚后，要充分供应肥水，促开花增结荚。植株开花结荚以后，一般追肥 2~3 次，每亩每次追尿素 5~15kg 或腐熟人粪尿 750~1000kg，采收盛期，随水追肥一次，可亩施二胺 25kg 或磷酸二氢钾 25kg。合理整枝，适当选留侧蔓，选留生长健壮，发生第 1 花序早的侧蔓，其中在主蔓中部以上长出的侧蔓，抽出第 1 花序后留 4~5 叶打顶，以增加花序数，并促进花序良好发育。

五、病虫害防治

豆角病害主要有根腐病和锈病。根腐病应以“预防为主、防治结合”的原则进行轮作制及田间管理，同时在播种时用 50%多菌灵 1 公斤加细土 400~500 公斤搅拌均匀后盖种，发病初期用 37%根腐灵 200~300 倍液或敌克松 1000~1500 倍液淋根，3~5 天淋一次，连续淋 2~3 次。锈病可用胶体硫 200~250 倍液或用 15%粉锈宁可湿性粉剂 150~200 克兑水 75~80 公斤喷雾。虫害主要有豆荚螟和豇豆荚螟，可用 25%杀虫双水剂 500 倍或卡死克 50~75 兑水 60 公斤从现蕾到初花期隔 7~10 天喷一次，连续喷 2~3 次。